

Service Régional de la Protection des Végétaux Site de Marmilhat BP 45 63370 LEMPDES Tél. 04.73.42.14.83 Fax 04.73.90.83.70

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de la DRAF AUVERGNE

Le Directeur gérant : D. DIDELOT

Publication périodique C.P.P.A.P n°23145AD ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 300 F Fax : 220 F

SPV Toute reproduction même partielle est soumise à

# AVERTISSEMENTS

AGRICOLES

DLP 12-11-01009003

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

# **AUVERGNE**

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°17 du 31 mai 2001 – 2 pages

## Blé

Stades: Fin floraison (10.5.3) à grain laiteux (11.1).

#### Maladies foliaires:

On observe l'explosion de la rouille brune et de la septoriose dans les témoins non traités.

#### Pucerons des épis

La pression reste très faible et ne justifie aucune intervention.

### **Tournesol**

2/4 feuilles à 8/10 feuilles.

#### **Pucerons**

Aucune des parcelles visitées n'a atteint le seuil d'intervention. Dans les parcelles les plus avancées, la population de pucerons s'est stabilisée depuis une semaine autour de 10 pucerons par plante grace à la présence des auxiliaires. Pour les tournesols plus tardifs, les populations de pucerons restent faibles (de 1 à 5 pucerons par plante en moyenne) alors que l'on note déjà la présence des auxiliaires

Ne pas intervenir mais rester vigilant en effectuant un comptage.

Seuil d'intervention: 30 à 50 pucerons par pieds.

# Maïs

2 à 8 feuilles

#### Pyrale

La lutte contre la pyrale du maïs est raisonnée en fonction de la pression larvaire dans les témoins non traités à l'automne précèdent. L'année dernière, la pression larvaire a été très faible et ne nous a pas permis de revoir la carte que vous trouverez en deuxième page.

Dans les zones où la population larvaire nécessite un traitement, vous avez trois possibilité de lutte : 1/ Traitement biologique avec les

1/ Traitement biologique avec les trichogrammes.

2/ Traitement avec une pyréthrinoïde liquide appliqué avec votre pulvérisateur au stade 1m /1.2m. Attention au risque de pullulations de pucerons.

3/ Traitement avec un insecticide microgranulé appliqué par enjambeur ou par traitement aérien. Le positionnement de ces différents traitements sera préciser dans les prochains bulletins.



Blé
Pas de risque
pucerons.
Tournesol
Faible
pression de
pucerons.

10 12 40 15 47245



7145

